ED Biochimie n 1

propriétés d'ionisation AA et peptides.

Etude générale de l'ionisation des AA.

exemple : Gly.

- sol aq, sans forme lipolaire par transfert d'H^+ sur la $\overset{-}{=}$ alcalin.

$NH_3^+ - CH_2 - COO^-$

- milieu ac. (HCl)

→ forme cationique par fixation H^+ sur COO^-

$NH_3^+ - CH_2 - COOH$.

- milieu alcalin → libération H^+ → $NH_2 - CH_2 - COO^-$ forme anionique.

$NH_3^+ - CH_2 - COOH$, propriétés d'un acide. (ajout Na_2OH)

$NaOH \rightleftharpoons H^+ + NH_3^+ - CH_2 - COO^-$

$NaOH \rightleftharpoons H^+ + NH_2 - CH_2 - COO^-$

état semblable à un diacide.

suivant la forme ionisée et la valeur du pH, de la concentration loi d'action de masse, K

2 Eq → 2 K : $K_1 = \dfrac{(\text{dipolaire})(H^+)}{(\text{forme ac})}$

$K_2 = \dfrac{(\text{forme basique})(H^+)}{(\text{dipolaire})}$

Quel rapport (dipolaire) : (forme ac)

K_1 ou K_2 dépend de $(H^+) \Leftrightarrow$ pH.

$\Rightarrow pK_1$ et pK_2 pour concentrations égales.

$K_1 = 5.10^{-3}$ M $\Leftrightarrow pK_1 = 2,3$ $\quad \log 2 = 0,3$

$K_2 = 2.10^{-10}$ M $\Leftrightarrow pK_2 = 9,7$

pH=0 $\frac{\text{dipolaire}}{\text{cation}} = \frac{K_1}{H^+} = \frac{5.10^{-3}}{1} = 0,5\%$ de forme dipolaire
33,5% de forme cationique

pH = 1 $\frac{5.10^{-3}}{10^{-1}} = 5\%$ forme dipolaire
55% " cation.

pH = 2 $\frac{K_1}{|H^+|} = 0,5$ 33,3% dipolaire.
66,6% cation

pH = 3 5 → 5 fois plus de dipolaire que cation.
pH = 5 500 → 500 " " "
pH = 6 5000 " " "

$\frac{K_2}{|H^+|}$ pH = 6 $\frac{2.10^{-10}}{10^{-6}} \rightarrow 2.10^{-4}$ fois + de cation que de dipolaire.

pH = 7 $\frac{K_2}{H^+} = 2.10^{-3}$ fois + de forme anionique que forme dipolaire.

pH = 9 $\frac{K_2}{H^+} = 0,2 \rightarrow$ 5 x + de dipolaire qu'anions.

pH = 10 $\frac{K_2}{H^+} = 2 \rightarrow$ 2 fois + anions que dipôle

pH = 11 $\frac{K_2}{H^+} = 20$.

⇒ 3 régions 1 → 4 8 → 11 pour le pH
valeurs de pK où forme un zwitterion.
4 → 8 : la Δ de pH produit des formes de proportions ioniques faibles.
prédominance forme dipolaire.
entre les 2 pK, prédominance forme dipolaire.
charge globale nulle = prédominance forme dipolaire
& |f. cat| = |f anionique|.


$K_1 . K_2 = |H^+|^2$ $|H^+| = \sqrt{K_1 K_2}$

$pH = \frac{1}{2}(pK_1 + pK_2)$


courbe de titrage Gly.

ajout HCl obtenir Gly sous forme cat.

ajout soude, 1 ml puis mesure et reconnaître




sol° tampon. entre pK_1 et pK_2



exo 2 : Asp.

4 formes d'ions°.

pH ac :



$+1 \xrightarrow{pK_1 = 2} 0 \xrightarrow{pK_2 = 4} -1 \xrightarrow{pK_3 = 10} -2$

valeur pK correspondante.

$pH_i = pH$ pour laquelle charge globale nulle.
prédominance forme 0.
$|f_{+1}| = |f_{-1}|$ $|f_{-2}|$ négligeable.
$pH_i = \frac{1}{2}(2+4) = 3$

$pH = 7$, soit au delà du point isoélectrique.
la fonction est dissociée $COO^- - CH_2 -$
influence la charge de la protéine.

exo 3: Lys

NH_3^+ (3) $- (CH_2)_4 - CH(NH_3^+)(2) - COOH$ (1) (+2)

pH ↑, ajout $pK_1 = 2,2$

↓

$NH_3^+ - CH(NH_3^+) - COO^-$ (+1)

↓ $pK_2 = 9$

$NH_3^+ - CH(NH_2) - COO^-$ (0)

↓ $pK_3 = 10,4$

$NH_2 - CH(NH_2) - COO^-$ (-1)

pH_i : prédominance forme neutre
$|f_{+1}| = |f_{-1}|$ $|f_{+2}|$ négligeable.
$\Rightarrow pH = 7$, Lys de protéines chargée (+).

applic⊖ analytiques de la séparation⊖.
pour séparer AA de charge.
. chromatographie d'échange d'ions.
. électrophorèse.
sol de Gly, Lys, Asp pH=6
polipeptides fonction forme.
vont + place vers pole ⊖ vers pole ⊕ ⇒ électrophorèse

. chromatographie d'échange d'ion.
séparer⊖ de mélange de ++ sol, phase ++ retient
sur support une liquide pour ++ phase liq.
dispersé forme physico chimique et propriétés solubles.
ici : échange d'ion.
support : échangeur d'ion = polymère insoluble portant
des ++ de charge + ++

forme⊖ réversible des ions.
affinité plus forte.
résines échangeuses de cations portant -COO⁻ -SO₃H⁻
" " anions " NH₃⁺
AA : 1 agent ++ charge nette ○ pas retenue par
échangeur.
AA agent charge ⊕ retenue par échangeur portant ⊖
.pH bas : Ns AA ss forme positive, Ns retenus par
échangeur de cations. de ma colonne.
on fait entrer ++ sol dont pH ↑ progressivement.
les acides A vont être détachés ++ fonct⊖ de pH:
qd AA a charge nulle ⇒ n'est plus accroché.
.pH=6, Asp sous forme ch. globale nulle, Gly ⊖
Lys ⊕
Asp sont retenus sur échangeur de cation.

→ pH = 7 Gly zwitterion, Lys reste.

AA autres pHi très proches les 1 des autres.
signes ⊖ pas simple.
≠ pH fines. — jeu sur Δ concentrations ioniques.

électrophorèse
migration particules chargées du champ $\vec{E}$.
charge globale nulle → reste en place.
= pK, L AA en migre pas.
pH < pK → forme cationique → ⊕
pH > pK " " ⊖
pH proche pK, ∃ formes ≠ pour = AA.
30% forme dip, 10% forme cat.
on se déplace que vers pôle ⊖ que 10%.
→ loi en ⊖ exp. 30% → 81% f. dip
↳ 3% f. cat.
qui se déplacent.

⇒ déplacement très limité.

ioniser ⊖ protéine.
COO^- et NH_3^- chargés, sont celles de bout de chaîne.
↓ gr ionisables des gr chaîne.
pour grosse protéine, gr chaînes latérales.
gr ac → COO^-
gr bas → NH_3^+
charge globale = résultante.
variation rapport. AA ac & AA bas, AA ionisé & AA non ionisé
→ pHi, pour lequel il n'y a charge globale nulle
si prédominance AA bas, pHi élevé.
caractère amphotère des protéines.
à ↓ pH, ⊕ions forme pour la protéine.
ex: pH où 30% chaînes basiques.
3 gr sur 10 de état ƒ basique.
3 gr sur 10 a forme ⊕. 3/10.
↓ pt une charge totale, 1 seule sorte.
signe ⊖: effet de tension sur relation avec champ électrique.
pour électrophorèse:
pH entre de 8,5 - 9. Mes protéines ont charge globale ⊖.
des glycoprotéines. entre gr ionisable: celui de l'ac sialique → pHi très bas.
à pH = 9, se déplacer plus vite si charge + forte limite ⊖: taille chaîne: frottement avec support chaîne petite se déplacer + vite que une grosse.


propriétés
solubilité du sol aq.
pression osmotique des protéines.

solubilité : ionisé important, solide grâce interact solvant-soluté + fort que solvant-solvant et soluté-soluté
H_2O → dipole.
pour dissolution, il faut, effet favorable, se fixer à proximité des gr ionisés éliminant interact entre molécules protéique.
- silice aq pure : insoluble. gr se retient.
silice très conc : insolubilisé protéine ions attirent à eux les molécules d'eau → → possibilité interact entre protéine.
"effet de relargage". insolubilisé avec sels minéraux - fort conc.
ions grâce forme silice aq plonge à côté protéines.
effet le + important au niveau du pHi.

pression osmotique. type particulier de osmotique.
cas d'une mb ½ perméable, un sol de protéine de autre côté ion diffusible.
protéine ne peut passer à travers mb. (AA) Na^+ Cl^-
Na^+ Cl^- passent des sac
protéine ne peut pas.
Eq de dialyse : + de Na^+Cl^- à int, autant par ions diffusibles. où il y a protéines.


Ed Biochimie. n 2.

glucides :
aldéhydes ou cétoniq, structural ou E
fonctions isomères.
. fonction → alcools ou cétones.



nb isomères 2^4 → 16 isomères stéréo
→ 8 formes D, 8 formes L.


glucose.




forme D, forme L H inversé.

gal

glucose et mannose sont épimères.



1-4 → furane
1-5 → pyrane.



Hs OH à droite → bas un cycle.
à gauche: → haut, Hes fonctions à l'ext
→ haut lorsque à droite.

1 cétone : le fructose.

Forme linéaire en chaîne. Les OH soit associés (1 plan) soit isolés.


16 isomères : 8D + 8L

8α 8β 8α 8β.

8β 8β 8β 8β.


8ch. 8 but


2 f. cétone.




Les isomères sont les C=O

3 C* : 8 → 4D + 4L





si β : OH en haut



formes tautomères : chaîne ou hémiacétal.
nb isomères 168. (aldohexoses + cétohexoses).

méthodes d'identification + dosages.
recherche glucose dans urine : examen, dialectique
dosage dans sang : biologique, alimentaire.
globales (= ttes mêmes) ou spécifiques.
propr. physiq : solubilité des sucres, chromatographie
des pentoses.
- pentoses réduction, cyclisation → furfural
(furfurol)
• réduction : f. alcool cétone.
si libre : réduit, si engagé dans hémiacétal : non.
sucre capable réduire sels Cu → milieu alcalin
à chaud : principe liq Fehling.

sucre + Cu^{2+} → $2Cu^{+}$ + sucre oxydé
↓ NaOH
$2CuOH$
↓
Cu_2O rouge brique.

<u>Cpd réducteurs</u> + urine
le contient Cu, sucre, sel Na et K (coupe effervescent)
sucre → glucose.
Cpd diminuent cyclo : furfural, produit SOH

furfural + α naphtol → pour voir H sucres.
f + α O Tolu hydrolase.
hydrolysucres : dosage glucose.
f + HCl + résorcine : cétohexose.

sol = la conc inconnue.
une sol à coté avec conc connue : étalon. en 1g/l.
a fait colorΘ. → spectrophotométrie.
une tube témoin : sur de l'eau + réactifs qui
-t mis à colorer. SANS sucre. = éliminer
col des réactif.
= même dieu tubes.

Δ Q ≠ concentration.

méthode Enz, spécifique.
pouvoir obtenir produit dt détermineΘ plus facile
à doser que le produit de départ lui-même.

glucose $\xrightarrow[\text{glucose oxydase}]{O_2\ H_2O}$ H_2O_2 + ac gluconique

↓ peroxydase.

O_2

produit chromogène

↓

produit coloré

dont colorΘ = la [c] de départ

principe des hexokinases pour mieux.
= chez pour galactose.
pour saccharose, hydrolyse en oligosaccharides
→ glucose + fructose. → Q glucose comme

lipides.

méthodes d'extraction.

2 sortes : utilisé solvant, extraction par solubilité différentielle, chromatographie sur colonne de SiO_2

avec méthanol (sépare lipo-protéines) + $HCCl_3$

↳ extrait sec.

+ HCl

↳ extrait seulement lipides. (pour extrait = classe lip).

+ acétone

↳ partie en sol + une partie qui précipite.

glycérides
cérides stérides
AG libre cholest.

↓ KOH (saponifié)

soluble + insaponifiable
glycérol | alcool gras
savons | stérol, Vit grasses

+ éther

↓

soluble + précipité
glycérophospholip | sphingolip.

↓ alcool

soluble + insoluble.
lécithine inositol
glycéroP

Acétique

soluble insoluble.
sphingosine cérébrosides

de éther pétrole. fait absorbé sur colonne silice.
esters cholestérols sont élués par
cholestérol libre.
AG libres
tri - di - monoG.
ac phosphatidiq
divers.
puis phosphatidyl choline et autres qui ne
sont chargés.


a saponificat totul.
Pentru 4,03 g de grăsime se consumă 50 ml KOH 0,4 M.
Titrarea a 12,5 ml HCl folosiți la titrarea KOH, 0,4 N.

50 ml KOH 0,4M → 50 · 0,4 = 20 mg
12,5 " " 0,4M → 12,5 · 0,4 = 5 mg.

⇒ KOH utilizat = 20 - 5 = 15 mg. pentru saponificat.

Tri G → 3 AG
Pentru mono G: 15 KOH → 15 mg mono G
tri G: " $\frac{15}{3}$ mg = 5 mg de tri G.

4,03 g tri G ≙ 5 mg.
1000 mg sunt X g.
$X = \frac{4,03 \cdot 1000}{5} = 806$ g.



AG = 806 - 83 = 717 g.
717/3 - 43 (grupa CO + CH3) = 196

$(CH_2)_n = 196$
$12n + 2n = 196$
$14n = 196$ $n = 14$ → acid palmitic.

m_mol et m_eq. dipend valenz.

si divalent → $m_{eq} = 2 \times m_{mol}$.

C.C.M. 1992 - PHARMACIE

EPREUVE DE BIOCHIMIE

NOM : TONTHAT Pierre gr E NOTE : 17,75 - 20

Sauf changement, le concours comporte vingt questions (ou leur équivalent) à traiter en 60 minutes.

Question n°1:

- Quels sont les traceurs permettant de mesurer l'eau intracellulaire :

on mesure l'eau totale, et on retranche l'eau extra cellulaire

mesurée avec : ^2H_2O, ^3H_2O, ou ~~pyridine~~

- Quels sont les traceurs qui permettent de mesurer le volume plasmatique :

iode radioactive, bleu Evans, bleu Chicago

0,25


- Un sérum sanguin contient respectivement 3,25 g/litre de Na et 58,5 g/litre de protéines. Quelles sont les valeurs correspondantes exprimées en milliéquivalents

(M.A. de Na = 23)


Na : 3,25 g/l $\Rightarrow \frac{3,25}{23} = 0,14$ mol/l = 140 mEq.

Question n°2 : Indiquez le nom et écrire la formule complète des acides aminés qui comportent dans leur structure :

- Une fonction amide (les deux plus fréquents):




glutamine




asparagine

- Une fonction imine



arginine

- Une fonction aromatique non phénolique



(1)

Question n°3 :

Donnez les noms et abréviations à trois lettres de ce peptide : V-A-C-H-E-S

V : Valine (Val) A : Alanine (Ala) C : Cystéine (Cys)

H : Histidine (His) E : acide glutamique (GLU) S : Sérine (Ser)

Parmi les acides aminés précédents, quels sont ceux qui sont indispensables (s'il y en a): Histidine (mais pas chez l'adulte)
Valine

(1)


Parmi les acides aminés précédents, quels sont ceux qui sont remplaçables et s'il y en a, par quel autre acide aminé :

Cystéine remplaçable par Méthionine


Question n°4 : Quel est le principe de la méthode de Sanger? A quoi sert-elle? Utilisée directement sur le peptide de la question n°3, quels seront les acides aminés identifiés.

Elle sert à identifier l'acide aminé qui commence la chaine peptidique.

méthode :



dinitro fluoro benzène




on identifie seulement la Valine

le reste du peptide est dissocié.

1

Question n°5 : Donnez la structure développée de ce tripeptide : Y E P



1


Question n°6 : Soit le glycopeptide suivant :

4

NH2-Val - Lys - Glu - Ala - Thr - Tyr - Arg - Pro - Ser - Met - Gly - Ala-COOH

Entourez d'un cercle les acides aminés indispensables et soulignez d'un trait les acides aminés glucoformateurs.

Question n°7 : Sur le même glycopeptide, indiquez les points d'action (uniquement majeurs) des ENDOPEPTIDASES digestives que vous connaissez:



(1)

Questiojn n°8 : Formule permettant de déterminer le pHi d'un amino-acide. Si le pHi d'un amino-acide est égal à 6,5 et son pKa égal à 4, quel sera son pKb ?

$$pH_i = \frac{1}{2}(pK_A + pK_B)$$

$$pK_B = 2pH_i - pK_A = 13 - 4 = 9$$

(1)

Question n°9 : L'acide glyoxylique en milieu sulfurique est utilisé pour le dosage coloré de certains acides aminés.

a) quels sont ces acides aminés?

le Tryptophane

(1)

b) Quelle est la couleur obtenue?

la couleur est violette

c) comment s'appelle cette réaction?

c'est la réaction d' Adamkiewicz - Hopkins

Question n°10 : Les aminopeptidases sont des enzymes :

(0,75)

a) de quel groupe :

exopeptidases (sur $-NH_2$)

b) Quelle est leur spécifité :


leucine, mais elles hydrolysent pour tous les AA N. Leimkuhler

=


c) Où sont-elles préférentiellement secrétées? dans le duodénum

Question n°11 : Ecrire la formule cyclique (HAWORTH) de l'alpha-D-galactose sous forme pyranique (pyranose) et sous forme furanique (furanose).

forme pyranique



forme furanique



0.5


par mesomerie, mettre pour. ehi en OH

Question n°12 : Quel produit sera obtenu par oxydation légère par l'iode uniquement de la fonction aldéhydique de l'alpha-D-galactopyranose.

a) son nom : [redacted]

on obtient l'acide D galactonique


b) sa representation selon Fischer?



1


c) si vous croyez que c'est possible, une representation sous forme cyclique :

forme cyclisée : D galactolactone
mais c'est un produit de déshydratation : qui n'a plus les mêmes propriétés.




Question n°13 : Représentez selon Haworth, les deux composés suivants. Indiquez pour chacun la particularité qui les distingue d'un aldohexose et leur localisation biologique préférentielle

alpha-D-fructofuranose



on le trouve dans le sucre ordinaire : le saccharose.
(en fait c'est le β-D)

alpha-L-Rhamnose



0,5

comparé que l'on trouve dans les végétaux. la fonction OH primaire n'existe plus.
forme L : peu répandue.

Question n°14 : Indiquer la formule brute, la dénomination scientifique et le nom usuel des acides gras saturés suivants :

C6 : acide hexanoïque = acide caproïque

C14 : acide tétradécanoïque = acide myristique

C20 : acide décosanoïque = acide arachidique

1

Question n°15 : Donnez la formule brute, la formule développée et la dénomination scientifique de l'acide undécylénique :

$CH_2 = CH - (CH_2)_8 - COOH$

$C_{11} H_{20} O_2$

0,5


acide 10 undécaénoïque

Indiquez le nombre de carbones des composés suivants :

acide N-acétylmuramique 18 — acide margarique 17

acide cérébronique — acide ~~glycarique~~ saccharique ou glucarique 6 (0.25)

Question 16 : Donner la formule développée de l'acide prostanoique. Quel est son rôle biologique?



précurseur dans la synthèse des hormones (prostaglandines) avec oxydation du carbone 9 en alcool ou cétone.

Donnez la dénomination scientifique et la formule développée de l'acide arachidonique.

$CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-CH_2-CH=CH-CH_2-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3-COOH$

acide 5,8,11,14 eicosatétraénoïque (1)

$C_n H_{2n-8} O_2$ $n=20$

↳ $M = 12.20 + 40-8 + 32$

Question n°17 : Quel est l'indice d'iode de l'acide arachidonique, c'est-à-dire la masse d'iode qui peut théoriquement se fixer sur 100 g d'acide arachidonique? (indiquez le calcul) (masse atomique de l'iode = 127)

indice d'iode : 4 mole de I_2 réagissent pour 1 mole de AG.


$n_{AG} = \frac{100}{304} = 0,32$ mole

$n_{I_2} = 4\, n_{AG} = 1,315$ mole

$m_{I_2} = 2M_I \cdot 4 \cdot n_{AG} = 334,2$ g (1)

Question n°18 : Donnez la formule développée du composé suivant :

1-palmityl 3-phosphocholine glycérol. Quel sera son nom usuel? Sera-t-il préférentiellement hydrolysé par la phospholipase A1 ou A2.



lysolécithine — 0,75

hydrolysé par phospholipase A2 et A1
formé par coupure sur le 2°C avec lipase A_2

Question n°19 : Quel est le nom de l'acide gras monoinsaturé à chaine linéaire dont la masse molaire est 254

$C_n H_{2n-2} O_2$ $\quad 12n + 2n - 2 + 32 = 254$

$14n = 254 - 30 \quad \Rightarrow n = 16$


acide ~~oléique~~

- Calculer le nombre de milliéquivalents de soude nécessaires pour transformer en savon 5,08 g de cet acide

$\frac{5,08}{254} = 0,02$ mole d'AG

↳ 0,02 mole de base pourra réagir $\hat{=}$ 20 mEq. — 0,75

Question n° 20 : Donner la formule de la sphingosine.



1

Quels sont les constituants d'un cérébroside? Combien de carbones comportera un galactocérébroside dont l'un des constituants sera l'acide nervonique.

sphingosine (18C) + acide gras (24C) + glucide (en C_6) (6C) $\Rightarrow$ 48C

correction :

- Na : $\frac{3,25}{23} \cdot 1 \cdot 10^4 = 141$ m Eq /l.

  7l g/l ⇔ 16 m Eq /l. d'anion.


  58,5 g/l ⇔ X X = 13 m Eq

. His pas de aromatiq.

. Sanguin : absorbe à 260 nm

. ac glycosaliq CHO – COOH

.



. ester cyclique : lactone.

. fructose de fruits α

  pour β → saccharose.

. Rhamnose de glycosides végétaux.

  fucose chez animaux, Sb gr sanguin, glycoprotéine de lait.

. éicosanoïque : arachidique.

. N acétyl muramique 11C

  de paroi bactérien

  ≠ ac N acétyl neuraminiq. de gangliosides et glycoprotéines.

. citrique : — C(OH) – COOH etC.

. sphing — ose — ose — ose ⇒ gangliosides.

  | AG

  | Ac neuraminiq